

GT/Tr 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
GEM	●							●														
PTX	●							●														
Tr	●																					

【投与量】

一般名（略語）	投与量
ゲムシタビン（GEM）	1250mg/m ²
パクリタキセル（PTX）	80mg/m ²
トラスツズマブ（Tr）	初回：8mg/kg、2回目以降：6mg/kg

【投与方法】

Day 1

1	生食 250mL	点滴静注	
	ジフェンヒドラミン(10mg) 5T	内服	
2	生食 50mL ファモチジン(20mg) 1A デキサート 1.65~8.25mg	点滴静注	5分
30分あける			
3	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分
4	生食 100mL ゲムシタビン 1250mg/m ²	点滴静注	30分
5	生食 250mL トラスツズマブ 6または8mg/kg	点滴静注	初回：90分 2回目以降：30分以上

Day 8

1	生食 250mL	点滴静注	
	ジフェンヒドラミン(10mg) 5T	内服	
2	生食 50mL ファモチジン(20mg) 1A デキサメタゾン 1.65~4.95mg	点滴静注	5分
30分あける			
3	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60分
4	生食 100mL ゲムシタビン 1250mg/m ²	点滴静注	30分