## SOX/Tr 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tr	•																				
L-OHP	•																				
<b>S1</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							

## 【投与量】

一般名(略語)	投与量				
トラスツズマブ(Tr)	初回:8mg/kg				
F 3/2/2 (II)	2 回目以降:6mg/kg				
オキサリプラチン(L-0HP)	100mg/ <b>m</b> ²				
	BSA<1. 25 m²	80mg/day(分2)			
テガフール・ギメラシル・オテラシル(S1)	1. 25 m²≦BSA<1. 5 m²	100mg/day(分2)			
	1.5 m²≦BSA	120mg/day(分2)			

\* S1 は day1 タ~開始

## 【投与方法】

1	ルート用 生食 100m L	点滴静注	
2	生食 250mL トラスツズマブ 6 または 8mg/kg	点滴静注	初回:90 分 2 回目以降:30 分以上
3	パロノセトロン注(0.75mg) 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30 分
4	5%ブドウ糖液 500mL オキサリプラチン 100mg/㎡	点滴静注	2 時間