

XELOX/Tr 療法レジメン

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Tr	●																					
L-OHP	●																					
Cape	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								

【投与量】

一般名（略語）	投与量	
トラスツズマブ (Tr)	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	
オキサリプラチン (L-OHP)	130mg/m ²	
カペシタビン (Cape)	BSA < 1.36 m ²	2400mg/day (分 2)
	1.36 m ² ≤ BSA < 1.66 m ²	3000mg/day (分 2)
	1.66 m ² ≤ BSA < 1.96 m ²	3600mg/day (分 2)
	1.96 m ² ≤ BSA	4200mg/day (分 2)

* Cape は day1 タ～開始

【投与方法】

1	ルート用 生食 100mL	点滴静注	
2	生食 250mL トラスツズマブ 6 または 8mg/kg	点滴静注	初回：90分 2回目以降：30分以上
3	パロノセトロン注 (0.75mg) 50mL デキサメタゾン 9.9mg	点滴静注	30分
4	5%ブドウ糖液 500mL オキサリプラチン 130mg/m ²	点滴静注	2時間