

VTD 療法レジメン

【cycle 1～8】

	1 週目							2 週目							3 週目						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BOR	●			●				●			●										
Thal	●	●	●	●																	
DEX	●	●	●	●																	

- 最低 72 時間空けて投与する事

【cycle 9～12】

	1 週目							2 週目			3 週目			4 週目							5 週目			6 週目		
	1	2	3	4	5	6	7	8	～	14	15	～	21	22	23	24	25	26	27	28	29	～	35	36	～	42
BOR	●							●			●			●												
Thal	●	●	●	●										●	●	●	●									
DEX	●	●	●	●										●	●	●	●									

【投与量】

- 1～8 cycles

一般名（略語）	投与量	投与日	
ボルテゾミブ(BOR)	1.3mg/m ²	Day 1,4,8,11	3 週毎
サリドマイド(Thal)	200mg/day	Day 1～4	
デキサメタゾン(DEX)	40mg/day	Day 1～4	

- 9～12 cycles

一般名（略語）	投与量	投与日	
ボルテゾミブ(BOR)	1.3mg/m ²	Day 1,8,15,22	6 週毎
サリドマイド(Thal)	200mg/day	Day 1～4,22～25	
デキサメタゾン(DEX)	40mg/day	Day 1～4,22～25	

【投与方法】

1	ボルテゾミブ 1.3mg/m ²	皮下注	3mg あたり 1.2mL で溶解（2.5mg/mL）
---	-----------------------------	-----	-----------------------------